
Soins et précautions post opératoires

Aérateurs trans-tympaniques

Vous ou votre enfant, venez de bénéficier de la pose d'aérateurs trans tympaniques. Pour permettre une cicatrisation dans les meilleures conditions et éviter certaines complications post-opératoires, certaines précautions sont nécessaires.

DEPART DE LA CLINIQUE

- Si l'intervention s'est déroulée sous anesthésie générale, le **repos** est préférable pour les 24 heures suivant l'intervention.
- **Nausées** et **fatigue** peuvent survenir après une anesthésie générale.

SUITES OPERATOIRES

- Il est possible que du liquide clair ou sanglant s'écoule par les oreilles, ceci est habituel et doit s'arrêter en quelques jours.
- Il n'y a habituellement **pas de douleurs** dans les suites opératoires.
- Si des gouttes auriculaires ont été prescrites par votre chirurgien, elles sont à instiller dans les oreilles à la posologie et pour la durée prescrite.
- Il peut être indiqué d'éviter l'eau dans les oreilles, ceci est fonction du **type d'aérateur** et de **l'avis de votre chirurgien** :
 - Soit l'exposition à l'eau est proscrite : il est nécessaire de porter une protection, par coque ou gobelet pour la douche, par port de bouchons étanches +/- bonnet de bain siliconé pour la baignade
 - Soit elle est autorisée mais il est nécessaire de respecter quelques consignes : **ne pas aller en dessous de 50 cm de profondeur en baignade, éviter les plongeurs et entrées brutales de la tête dans l'eau**
- Les voyages à la montagne, voyages en train, ou avion ne posent pas de problèmes particuliers.
- Une consultation de contrôle vous sera proposée par votre chirurgien pour vérifier la bonne position de l'aérateur et sa perméabilité, puis un suivi régulier.

EN CAS DE DOUTE OU D'ANOMALIE

- 1- Contacter votre médecin traitant
- 2- Contacter notre secrétariat au 03.88.44.20.12.
- 3- Contactez les urgences de clinique Rhéna 24h/24 et 7j/7